

Африканская чума свиней (АЧС) – высоко контагиозная вирусная болезнь домашних и диких свиней, которая протекает в виде эпизоотии. Болезнь может протекать остро, подостро, реже хронически. Летальностью достигает 100%.


Характерными клиническими признаками болезни являются высокая постоянная лихорадка в течение 3-7 дней (температура тела повышается до 41-42 С), угнетение, посинение или покраснение кожи ушей, живота, промежности и хвоста, диарея, каловые массы дегтеобразной консистенции, иногда с примесью крови. Болезнь заканчивается летально на 5-10 сутки после появления первых симптомов.

Источником возбудителя АЧС являются больные и переболевшие свиньи. Основным источником возбудителя АЧС в природе – дикие свиньи. Факторами передачи возбудителя АЧС являются инфицированные объекты внешней среды (корма, кормовые отходы, вода, предметы ухода, навоз и другое), трупы павших свиней и продукты убоя инфицированных свиней. Период с момента заражения свиней до появления выраженных признаков АЧС составляет 5-15 суток.

С целью предупреждения заноса вируса АЧС в личное подсобное хозяйство следует исключить, кормление свиней сырыми пищевыми отходами. При входе в сарай необходимо оборудовать дезинфицирующий коврик, иметь отдельный комплект одежды (который рекомендуется ежедневно подвергать стирке) и обуви. Так как основным источником возбудителя АЧС являются дикие свиньи, то необходимо максимально исключить посещение лесных угодий. При посещении лесных угодий строго соблюдайте меры личной гигиены. Не допускайте посещение животноводческих помещений в одежде и обуви, в которой посещали лесные угодья.

Особое внимание нужно обратить при обнаружении трупов павших диких кабанов. При обнаружении трупов павших диких кабанов необходимо сообщать в представительство «Белорусского общества рыболовов и охотников» по Славгородскому району и в ВСУ «Славгородская райветстанция».

Главный ветеринарный врач  
Славгородского района

 В.В. Павлючков